



# SUSPENSÃO DE MEDICAMENTOS NO PRÉ-OPERATÓRIO

## ANÁLOGOS DO GLP-1 SUBCUTÂNEOS: SUSPENDER 21 DIAS ANTES DA CIRURGIA

DULAGLUTIDA (TRULICITY)  
EXENATIDA (BYETTA E BYDUREON)  
LIRAGLUTIDA (VICTOZA, SAXENDA, OLIRE E LIRUX)  
LIRAGLUTIDA + INSULINA DEGLUDECA (XULTOPHY)  
LIXISENATIDA + INSULINA GLARGINA (SOLIQUA)  
SEMAGLUTIDA (OZEMPIC, RYBELSUS E WEGOVY)  
TIRZEPATIDA (MOUNJARO)

## ANÁLOGOS DO GLP-1 VIA ORAL: SUSPENDER 7 DIAS ANTES DA CIRURGIA

SEMAGLUTIDA (RYBELSUS)

## FITOTERÁPICOS

CAMOMILA, LAVANDA E PASSIFLORA  
**SUSPENDER 24H ANTES DA CIRURGIA**  
GINKGO BILOBA E GINSENG - **SUSPENDER 10 DIAS ANTES DA CIRURGIA**  
KAVA-KAVA, ALLIUM SATIVUM (ALHO), CURCUMA, VALERIANA, ERVA DE SÃO JOÃO (HYPERICUM) – **SUSPENDER 7 DIAS ANTES DA CIRURGIA**  
ÓLEO DE PEIXE (ÔMEGA 3)  
**SUSPENDER 3 A 5 DIAS ANTES DA CIRURGIA**  
VALERIANA – **SUSPENDER 14 DIAS ANTES DA CIRURGIA**  
VITAMINA E EM ALTAS DOSES  
**SUSPENDER 7 DIAS ANTES DA CIRURGIA**

## ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS: SUSPENDER 7 DIAS ANTES DA CIRURGIA

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (ASPIRINA AAS, SOMALGIM)  
CLOPIDOGREL (PLAVIX)  
PRASUGREL (EFFIENT)  
TICAGRELOL (BILINTRA)

## ANTICOAGULANTES VIA ORAL: SUSPENDER O USO DE 48H A 72H ANTES DA CIRURGIA

APIXABANA (ELIQUIS)  
DABIGATRANA (PRADAXA) – SE INSUFICIÊNCIA RENAL, SUSPENDER 96H ANTES DA CIRURGIA  
EDOXABANA (LIXIANA)  
RIVAROXABANA (XARELTO, RIVAXA)

## ANTICOAGULANTES SUBCUTÂNEOS: SUSPENDER O USO 24H ANTES DA CIRURGIA

ENOXAPARINA (CLEXANE, HEPARINOX, VERSA E VOLARE)  
HEPARINA (HEPAMAX E HEMOFOL)

## ATENÇÃO:

**ANTICOAGULANTES E ANTIAGREGANTES AUMENTAM RISCO DE HEMORRAGIA, ANÁLOGOS DO GLP-1 ELEVAM RISCO DE ASPIRAÇÃO DURANTE A CIRURGIA E OS FITOTERÁPICOS PODEM INTERFERIR NA COAGULAÇÃO.**

ELABORADO POR: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA HOSPITALAR E COMISSÃO DE GESTÃO DE RISCOS

DATA: 12/01/2026

APROVADO POR: ANA FIORIN, DRA. PAULA ESPITIA, JULIANA VAZ E PALOMMA GARCIA